

Fuld narkose til tandbehandling

Vejledning til patienten

Hvem kan tilbydes fuld narkose til tandbehandling..?

Fuld narkose til tandbehandling er en mulighed til patienter som er særligt nervøse eller bange for tandbehandling, samt patienter med visse psykiske lidelser.

Herudover kan fuld narkose dog stort set tilbydes til alle, som ønsker dette. Undtaget herfra er dog patienter med specielt kroniske sygdomme såsom astma, bronchitis, rygerlunger, hjertesygdomme, stofskifteproblemer og svær fedme. Hvis du er i tvivl hvorvidt du kan tilbydes fuld narkose til tandbehandlingen, kontakt da tandlægen og/eller narkoselægen for afklaring.

Narkoseform:

Vi benytter den "traditionelle" form, hvor patienten bedøves fuldt; d.v.s at patienten **intet** registrerer af behandlingen. Ved fuld narkose har tandlægen fuldstændig arbejdsro, men giver ofte et længere opvågningsforløb.

Er det farligt at blive fuldbedøvet til tandbehandling..?

Under tandbehandlingen vil du blive overvåget efter gældende nationale og internationale anbefalinger, hvilket indebærer måling hvert 5.minut (eller hyppigere) af puls, blodtryk, iltindhold i blodet, samt kuldioxid i udåndingsluften.

Er man i øvrigt en helt rask person er der kun en meget lille risiko for komplikationer, som følge af narkosen.

Nærmere oplysninger kan gives af narkoselægen.

Hvilke forholdsregler er der forud for narkose..?

Man skal være fastende for fast føde og mælkeprodukter minimum 6 timer før bedøvelsen skal startes. Man må drikke kaffe (**uden fløde/mælk**), the (**uden fløde/mælk**) og vand/saftevand indtil 2 timer før det planlagte narkosetidspunkt. Man må ryge indtil 2 timer før narkosen.

Er der andre vigtige forholdsregler..?

Ja, det er meget vigtigt at man bliver transporteret til og fra klinikken, da man **ikke** er i stand til at køre bil efter behandlingen. Det er også vigtigt at have en person i sin nærhed til næste morgen.

Selvom det er usandsynligt at man skulle få bivirkninger af narkosen så lang tid efter indgrebet, er det væsentligt at man har hjælp omkring sig, idet det ikke er ualmindeligt at man er mere træt end sædvanligt. Desuden kan man godt opleve en smule svimmelhed som eftervirkning til narkosen.

Normalt forsvinder dette efter 6-18 timer og det er i øvrigt helt ufarligt.

Nærmere oplysninger kan gives af narkoselægen.

Hvis man har piercing i tunge eller læbe, skal disse fjernes forud for et indgreb i fuld narkose.

Priser, betalingsbetingelser og tider..?

Tidspunktet for narkosen bliver aftalt ved den første konsultation, hvor der udarbejdes en behandlingsplan. Der tages nødvendige røntgenbilleder og der aftales hvilken type behandling man ønsker, baseret på fyldestgørende overslag. Denne skrivelse og indbetalingskort bliver udleveret denne dag, da betaling af hele behandlingen forfalder 10 dage før narkosebehandlingen.

Med venlig hilsen
Tandlægehuset